

**Laufende Studien, Patienteneinschluss möglich (Stand 12.12.2018)**

Indikation		Titel	Phase	
<b>Hodgkin - Lymphom</b>	Hodgkin - Lymphom, ED, ( 18- 60 J.)	<b>HD 21</b>	III	
<b>Metastasiertes Kolorektales Karzinom</b>	Metastasiertes Kolorektalkarzinom (ab 18J.) (Erstlinientherapie)	<b>PanaMa</b>	II	
<b>Akut Myeloische Leukämie</b>	Neu diagnostizierte Leukämie (18-60J.)	<b>2Dauno</b>	III	
<b>Akut Myeloische Leukämie</b>	bei Vorliegen einer kompletten Remission, wenn keine allogene SZT angezeigt ist	<b>Blast</b>	II	
<b>ZNS - Lymphom</b>	ZNS - Lymphom (18-65J.) (66-70J. bei ECOG ≤ 2	<b>Matrix</b>	III	
<b>Metastasiertes Pankreas-karzinom</b>	Metastasiertes Pankreaskarzinom	<b>Qolixane</b>	NIS	
<b>Mantelzell-Lymphom</b>	< 65	<b>Triangle</b>	III	
<b>Eisenmangel-anämie</b>	Metastasiertes Kolorektales Karzinom	<b>FerInject</b>	II	
<b>NHL</b>	Ältere Patienten (61-80 Jahre) mit aggressivem CD20+ B-NHL	<b>Optimal</b>	III	
<b>Akute Lymphatische Leukämie</b>	ALL < 55 Jahre	<b>GMALL 08/2013</b>	IV	
<b>Promyelozyten-leukämie</b>	18 - 65 Jahre	<b>Apollo</b>		
<b>Akute Myeloische Leukämie</b>	55-75 Jahre, CD 19 positive, Ph/BCR-ABL negative B-Vorläufer ALL	<b>EWALL-BOLD</b>	II	
Hodentumore	>18	<b>Tiger</b>	III	
<b>In Planung</b>				
	Multiples Myelom	<b>DSMMXVII</b>		